



Magyar Tacskók Országos Egyesülete

T E N Y É S Z T É S I S Z A B Á L Y Z A T

TARTALOMJEGYZÉK

1. Tenyésztés
 - 1.1 Definíciók, fontos tenyésztési alapszabályok
 - 1.2 Tenyésztési folyamat és módszer
 - 1.2.1 A mesterséges megtermékenyítés
 - 1.3 Tenyésztési feltételek
 - 1.3.1 A tenyésztés alapvető feltételei
 - 1.3.2 A tenyészthetőség meghatározása
 - 1.3.3 Tenyészszemle
 - 1.3.4 A tenyésztésbe vonás feltételei
 - 1.4 A tenyésztésből kizáró okok
 - 1.4.1 A tenyésztésből való kizárási hibák
 - 1.5 Különböző színváltozatok keresztezése
 - 1.5.1 Tiger színű tacskó tenyésztése
 - 1.6 Elfogadott tacskó színek
 - 1.7 Tenyészhely ellenőrzés
 - 1.8 MTOE Tenyésztési Felelős
2. A tacskók helyes tartására, gondozására javaslat
 - 2.1 Kennelben tartás
 - 2.2 Egyéb tartás
 - 2.3 Gondozás és ápolás
 - 2.4 Oltás és féregtelenítés

A Magyar Tacskósok Országos Egyesülete (továbbiakban: MTOE) – attól a céltól vezérelve, hogy a fajta minden előnyös tulajdonságának megőrzésével rögzítse és nemesítse standardkövető populációját – megalkotta jelen Tenyésztési Szabályzatát. Az egyesület - mint a MEOESZ és az FCI tagja – ezen Tenyésztési Szabályzat előírásainak alkalmazásával kívánja a fajta tenyésztését, és az azzal kapcsolatos tevékenységeket szabályozni. Ez kötelezően vonatkozik az Egyesület és az egyesületen kívüli valamennyi tacsó tenyésztőjére.

Tenyészcél:

Az MTOE mint fajtagazda tenyésztő szervezet a Tenyésztési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a fajta tenyésztésének a céljait a következőkben foglalja össze:

- A standardnak (FCI 148. sz.) megfelelő fenotípusos
- Örökletes terheltségektől mentes egészséges állomány tenyésztés

Általános Jellemzés:

A tacsó külsőleg egy alacsony, hosszában nyújtott, izmos, harmonikus felépítésű állat, kihívó, figyelmes fejtartással. A talajtól való távolsága a marmagasság kb. 1/3-át teszi ki.

A tacsónak barátságos természetűnek kell lennie, kiegyensúlyozott temperamentummal, valamint szenvedélyes, kitartó és jó szaglású **vadászkutyának** kiváló egészségi állapottal.

Szörváltozat alapján három változata létezik:

- rövidszőrű
- szálkásszőrű
- hosszúszőrű

Illetve három méret:

	Szukák	Kanok
	mellkas körméret	mellkas körméret
Normál (standard)	35 cm – 45 cm	37 cm – 47 cm
Törpe	30 cm – 35 cm	32 cm – 37 cm
Kaninchen	25 cm – 30 cm	27 cm – 32 cm

Csak a mellkas körmérete a meghatározó, nincs súly felsőhatár !

A tenyésztés folyamán a szörváltozatok nem keverhetők. Egyes almokban különböző szőrtípussal született kölykök alomellenőrzés után törzskönyvezhetők, továbbtenyésztés esetén a törzskönyvön és a tenyészszemlén meghatározott szőrtípusban használatosak.

A tenyésztés folyamán a méretváltozatokat nem javasolt keverni!

A genetikai sokszínűség fenntartása érdekében egy méret ugrás viszont megengedett.

A tenyészpár vonatkozásában akár a kan akár a szuka lehet eggyel kisebb vagy eggyel nagyobb. A méret ugrás nem engedély köteles, viszont a tenyésztőnek kérdés esetén hiteles indoklással kell rendelkeznie az alkalmazott tenyésztési koncepcióról.

1. Tenyésztés

1.1 Definíciók, fontos tenyésztési alapszabályok:

A szuka „tulajdonosa” az a személy, akinek a tulajdonában van a kutya, és aki ezt bizonyítani is tudja a tulajdonjogára átírt származási lappal, vagy kölcsönadási szerződéssel. A fedező kan tulajdonosának az a személy számít, aki a fedező kan származási lapján felvezetett tulajdonos, vagy általa szerződéssel meghatalmazott személy arra, hogy a fedező kant a szuka fedezésére rendelkezésre bocsátja.

Egy alom tenyésztőjének az tekinthető, aki a fedeztetés időpontjában a szuka tulajdonosa vagy kölcsönadási szerződéssel rendelkezik, és FCI levédett kennelnévvel rendelkezik.

A szuka vagy a fedező kan tenyésztésre vonatkozó használati jogát át lehet ruházni egy harmadik félre szerződés által, ugyanez vonatkozik a befedeztetett szuka eladásakor létrejövő tenyésztői jog átadásra. A tenyésztési jogok átruházását - bérleti szerződést - kötelező írásban rögzíteni még a fedeztetés előtt. A bérleti szerződést mellékelni kell a fedeztetési jegyhez, amelynek világosan körvonalaznia kell a két szerződő fél jogait és kötelességeit.

Jelen szabályzat a szuka „bérlőjét” tekinti tulajdonosnak a fedeztetés időpontjától a kölykök leválasztásáig (10 hetes kor).

A megszületett kölykök, - ha azonos fajtájú fajtatiszta kutyáktól származnak, amelyek rendelkeznek FCI által elismert származási lappal és megfelelnek jelen szabályzat előírásainak - származási lapot kapnak és jogosultak FCI által elismert pedigrékre. A megszületett kölyköket a szuka tulajdonosának „Alombejelentő” alkalmazásával be kell jelenteni regisztrációra a leválasztás előtt olyan időben, hogy a kölykök egyedi megjelölése (chip) még a tenyésztőnél megtörténhessen. Ha a kutya eladása nem Magyarországra történik, akkor az új tulajdonos nevére szóló export pedigrét kell kiállíttatni.

A MTOE a fajta fejlődésének és a meglévő populáció minőségének javítása érdekében egyik fő céljának tartja, hogy tenyésztetni csak az elismert fajta szervezetek tenyészszemléljén elbírált egyedekkel lehessen.

Ezért Eb Származási Igazolás megjelöléssel származási lapot csak azok az utódok kaphatnak, melyeknek szülei már a fedeztetés napján megfelelnek az MTOE jelen szabályzatában támasztott feltételeknek is. Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben, még a fedeztetés előtt az MTOE elnökéhez és az MTOE tenyésztési felelőséhez írásban benyújtott kérelemmel lehet fordulni, melynek tartalmaznia kell miért nem teljesültek a szükséges feltételek, valamint a tenyésztési érdeket/célt alaposan indokolni kell. Utólagos (fedeztetés utáni) engedélyeztetésre (ide tartozik a „nem kívánt, véletlen párosodás” is), valamint alapos indok hiányában beadott kérelem engedélyezésére nincs lehetőség.

Az a kölyök jogosult Premium származási lap kiváltására, amely kölyök szülei rendelkeznek a fajtagondozó tenyésztésre vonatkozó előírásaival, pluszban munkavizsgával és küllem Champion minősítéssel (Hungária Champion, vagy bármely más ország Champion bizonyítványával.) Genetikai teszt megléte esetén kiváltható a munkavizsga vagy a champion minősítés.

Egy alomból származó kölyköket csak egyben, egy alkalommal lehet regisztráltatni.

Ha a kölykökről 4 hónapos korukig nem kerül beadásra „Alombejelentő”, akkor csak DNS vizsgálat birtokában lehet a regisztrációt elvégeztetni, melynek minden anyagi vonzata a tenyésztőt terheli. A kölykök egy éves korának betöltése után regisztrációra nincs további lehetőség.

A szukát normál szituációban csak egy kan fedezheti be. Amennyiben a tenyésztő engedélyt kért több kan használatára, akkor a tenyésztő költségére, DNS vizsgálattal bizonyítani kell, hogy melyik kölyök, melyik kantól származik.

1.2 Tenyésztési folyamat és módszer

A tenyésztést jó előre meg kell tervezni. Többféle változat tenyészthető szőrhosszúság és méret alapján.

- Idegen tenyészet: a tenyésztésre szánt partner nem rokon. Közös elődök a hetedik generációtól fordulhatnak elő.
- Csekély beltenyésztés: További távoli rokonok párosítása
- Szoros beltenyésztés: Szülő-kölyke (1:2), féltestvérek (2:2) valamint ükunoka - dédszülő (1:3)
- **A testvér fedeztetés szigorúan tilos.**

A szoros beltenyésztéshez a tenyésztő szervezet (MTOE) fedeztetés előtti írásbeli beleegyezése szükséges.

Általában a természetes aktus használatos. A szuka tulajdonosa köteles tájékoztatást adni a kan tulajdonosának az esetleges betegségekről.

1.2.1 A mesterséges megtermékenyítés

Adminisztratív szempontból mesterséges megtermékenyítésnek az állatorvos által végzett beavatkozást tekintjük.

Amennyiben a beavatkozás során mind a kan, mind a szuka jelen van, akkor az állatorvos igazolást ad arról, hogy a kan és a szuka egyedi azonosításáról meggyőződött. Friss és fagyasztott sperma felhasználása esetén (amikor az apaállat nincs jelen) az állatorvos igazolást ad ki a megtermékenyítés tényéről. Az igazolás során a beérkező dokumentumok alapján igazolja a kan kutya kilétét.

Az alombejelentés során a szuka tulajdonosa köteles az eredeti kísérő dokumentumokat az alombejelentő mellé csatolni.

A spermát biztosító fedezőkan tulajdonosának adnia kell egy aláírt fedeztetési igazolást a szuka tulajdonosának az állatorvos által kiadott igazolás mellé.

1.3 Tenyésztési feltételek

A tenyésztésbe vétel előtt a tenyésztésre szánt egyedeket a fajtagondozó szervezetek által szervezett tenyészszemlén, minősíteni kell.

1.3.1 A tenyésztés alapvető feltételei

- A MEOESZ-nél kiváltott kennelnév.
- Tenyésztési csak legalább 4 generációra zárt FCI származási lappal rendelkező kutyákkal lehet, amelyek az FCI standard-ben meghatározott megfelelő küllemmel és temperamentummal rendelkeznek, funkcionálisan egészségesek és örökletes betegségektől mentesek, valamint regisztrálva vannak egy FCI által elismert származási lapban vagy függelékben.
- Csak funkcionálisan egészséges kutyák tenyészthetők. A tenyésztő felelősséggel tartozik azért, hogy az általa tenyésztésbe vont kutya a viselkedési és a testi adottságainál fogva alkalmas a tenyésztésbe vételre. A tenyésztőnek jó körülményeket kell biztosítania a tenyészgyedek részére, ami megfelel a fizikai és lelki igényeiknek és az utódok fejlődésének, szocializálódásának.
- Az FCI Tenyésztési Szabályzata alapján egy kutya akkor mentes örökletes betegségtől, ha egészségesen örökíti a fajta jellemzőit, típusát és tipikus temperamentumát anélkül, hogy bármilyen lényeges örökletes hiányosságot mutatna, amely gyengítené az utódok funkcionális egészségét. A tenyésztés során mellőzni kell minden olyan jellegű túlzást, amely a kutyák funkcionális egészségének károsodását okozhatja.
- Nem lehet kutyát tenyésztési a fajta standard-jében felsorolt kizárásra okot adó hibákkal, valamint rejtett heréjűséggel (Kryptorhizmus), félheréjűséggel (Monorhizmus), illetve örökletes, vagy az életvitelt lehetetlenné tevő betegségekkel.
- Mind a szuka, mind a kan tenyészthetőségének igazolása:
a fajtagondozó szervezetek által szervezett tenyészszemlén legalább Tenyészthető minősítés.

1.3.2 A tenyészthetőség meghatározása

Az MTOE évente legalább 6 alkalommal, lehetőség szerint az ország tájegységeire elosztva előre meghirdetett tenyészszemlét tart.

Tenyészszemlén bírós az lehet, aki tacsók fajtára FCI által elismert küllembíró.

A tenyészszemle bírálat legkorábbi időpontja standard méretű tacsók esetében a betöltött 12 hónapos kor, kaninchen és törpe méretű tacsók esetében a betöltött 15 hónapos kor (konfirmációval egybekötve a tenyészszemle).

A tenyészszemlén szerzhető minősítések:

- Tenyésztésre javasolt (TJ)
- Tenyészthető (T)
- Visszarendelve (1 év)
- Kizárva (K)

Tenyésztésre nem engedélyezett (Visszarendelve) minősítés esetén a tenyészszemle egy éven belül nem ismételt meg. Egy év eltelté után maximum egy alkalommal jelentkezhet ismét.

Amennyiben a minősítés újból tenyésztésre nem engedélyezett (Kizárva), az eredmény véglegesnek tekinthető.

A tacsó fajták vonatkozásában harmonizálva az anyaország rendelkezéseivel a tenyészszemlén küllemi bírálattal folyik.

Tenyészszemlén egyedi azonosíthatóság nélkül kutya nem bírálható el. Amennyiben a benevezett kutya nem azonosítható, annak okát az illetékes klub/szervezet köteles kivizsgálni. Az egyed azonosításával, egyedi megjelölésével kapcsolatos minden eljárás a tulajdonost terheli.

A tenyészszemlén egyedi bírálati lap készül 2 példányban, ami minősítést, illetve a bíró aláírását tartalmazza. Az összesítőre felkerül minden elbírált kutya minősítése, amit a bíró kézjegyével ellát. A MTOE a bírálati lap és összesítő egy példányát az MTOE a saját irattárában 5 évig köteles megőrizni. Az MTOE a helyszínen köteles a származási igazolásra a tenyészszemle minden eredményét felvezetni, illetve pecsétjével ellátni azt és a bíróval aláírni. A felkért küllembíró az MTOE speciális bírálati lapján rögzíti véleményét.

1.3.3 Tenyészszemle

A bírálattal után a bíró a standardot alapul véve eldönti, hogy az egyed **tenyészhető, tenyésztésre javasolt vagy tenyésztése nem engedélyezett, kizárva.**

Ne felejtjük el, hogy nem a sokszorosan győztes kanok a legjobb tenyészpartnerek hiszen lehet, hogy pont azokkal a hibákkal rendelkeznek, amivel a mi szukánk is. Akkor jó és megalapozott a tenyésztés, ha javító hatást tudunk elérni az utódokban. Ehhez nyújt nagy segítséget a részletes leíró jellegű Tenyészszemle.

1.3.4 A tenyésztésbe vonás feltételei

<i>A tenyészállattal szembeni követelmények</i>	<i>Kan</i>	<i>Szuka</i>
Törzskönyv bejegyzés	FCI zárt törzskönyv	FCI zárt törzskönyv
Minimális életkor	15 hónap	15 hónap
Maximális életkor		8. életév vége
Formai értékjegyek	A fajtagondozó szervezetek tenyészszemléin szerzett: Tenyészhető, Tenyésztésre Javasolt értékelés.	A fajtagondozó szervezetek tenyészszemlén szerzett: Tenyészhető, Tenyésztésre Javasolt értékelés.

	<p>- Javasolt egy előírásoknak megfelelő szemvizsgálat.(PRA,katarakta,ceratitis)(javasolt)</p> <p>Minden kannak a saját országában érvényes tenyésztési engedéllyel kell rendelkeznie.</p>	<p>- Javasolt egy előírásoknak megfelelő szemvizsgálat.(PRA,katarakta,ceratitis)(javasolt)</p> <p>Minden szukának a saját országában érvényes tenyésztési engedéllyel kell rendelkeznie</p>
Időbeli ellés gyakoriság	<p>Kan esetében az egy kan általfedezhető szukák, illetve az éves fedeztetéseinek száma nincs korlátozva. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az állatvédelmi törvényt és a kan teljesítőképességét (kondíció, egészség) figyelmen kívül lehet hagyni.</p>	<p>Ha 2 egymást követő tüzelésnél is tenyésztésbe került és abból alom is született, akkor a harmadik tüzelést kötelező kihagyni!</p> <p>Az ellést követő ivarzást is lehetőleg mindig ki kell hagyni. Ha egymást követően mégis befedeztetésre került és mindkét esetben alom is született, a rá következő tüzeléskor mindenképpen TILOS a szukát befedeztetni! Két év alatt tehát maximum három alom hozható le úgy hogy ebből egy év alatt maximum kettő és utána TILOS a rákövetkező tüzeléskor a szukát fedeztetni.</p>
Egészség	<p>Csak egészséges kutyák tenyészthetők. Ezen kívül érvényes védőoltást kell beadni a fertőző betegségek ellen: Szopornyica, Hepatitis, Leptospirosis , Parvo és veszettség.</p>	<p>Csak egészséges kutyák tenyészthetők. Ezen kívül érvényes védőoltást kell beadni a fertőző betegségek ellen: Szopornyica, Hepatitis, Leptospirosis , Parvo és veszettség.</p>

1.4 A tenyésztésből kizáró okok

1.4.1 A tenyésztésből való kizárási hibák

Foghibák

- Fogzáródási rendellenességek: (előreharapás, hátraharapás, kulisszaharapás, az állkapocs szemfogainak hibás elhelyezkedése)
- A részbeni harapófogó és harapófogó harapás 3 éves kor után szukáknál nem kizáró hiba, de nem kívánatos. Fialább egyedeknél és kanoknál tenyésztésből kizáró ok.
- Egy vagy több metszőfog (I) vagy szemfog (C) hiánya.
- Az előzáfogok vagy záfogok hibája a következő kivételekkel:

Kettő P1 hiánya nem hiba, egy P2 hiánya nem hiba, az M3 figyelembe vétel nélkül marad (hiánya nem hiba).

A foghibák érvényessége egyes esetekben:

A foghiba leírása	Nem hiba	Tenyésztésből kizáró hiba
egy vagy több metszőfog (incisivus) hiánya		X
egy vagy több szemfog (caninus) hiánya		X
egy vagy kettő előzáfog P1 hiánya	X	
három vagy négy hiányzó P1		X
kettő P1 és egy további fog P2 vagy M1 és M2 hiánya		X
egy vagy több hiányzó P3, P4, M1 vagy M2		X
egy P2	X	
egy P2 és egy másik fog P1, P2, P3 vagy P4, illetve M1 vagy M2 hiánya		X
egy vagy mindkét M3 hiánya	X	

Kommentár: metszőfog = Incisivus (röviden: I); szemfog = Caninus (röviden: C); előzáfog = Premolar (röviden: P); záfog = Molar (röviden: M).

Egyéb kizáró okok

- súlyos, a korrekt mozgást megakadályozó végtagszerkezeti hibák
- megtört vonalú, rövid szegycsont, emiatt hibás alsó vonal
- a farok összes szerkezeti hibája (törött, összenőtt, deformált csigolyák)
- nagyon rövid felkar, nagyon meredek hátulsó végtagszögellések emelkedő farral (a lapocka és a felkar közötti ideális szög körülbelül 90 fok)
- nyilvánvaló látáskárosodás, Entropium, Ektropium

- örökletes halláskárosodás
- epilepsziás rohamok
- a mozgás szervrendszerének bármintemű, súlyos funkcionális hibája
- a herék bármintemű rendellenessége, rejtett heréjűség
- fekete alapszín jegyek nélkül
- fehér alapszín jegyekkel vagy a nélkül, a standardban megállapított szintől való eltérés (lásd 2. sz melléklet)
- túl félénk vagy agresszív magatartás
- erős pontyhát
- nem a standardnak megfelelő szemszín
- nyilvánvaló térdkalácsficam
- szőrváltozat keresztezésből származó egyedek

1.5 Különböző színváltozatok keresztezése

Nem javasolt az alábbi színpárosítások keresztezése, mert pigmentációs hibákat és egyéb súlyos rendellenességeket okozhat:

NEM JAVASOLT TACSKÓ SZÍNKERESZTEZÉSEK

Apa kutya szín	Anya kutya szín
Csíkos	csíkos
Csíkos	tíger

TILTOTT TACSKÓ SZÍNKERESZTEZÉSEK

Apa kutya szín	Anya kutya szín
Tíger	tíger

A tiszta szín előnyben részesítendő és a vörös értékesebb mint a vöröses sárga és a sárga. Az erősen feketével tűzött kutyák is ide tartoznak. A fehér szín nem kívánatos, de külön álló kicsi foltok nem kizáróak. MTOE megvizsgálja, ha olyan színváltozat fordul elő, amely nem lehetséges.

Tiger színű tacskó tenyésztése

Az alap szín mindig a sötét szín (vörös, fekete vagy barna). A pároztatás a tigre színű tacskók és egyszínű, kétszínű illetve hasonló/egyforma szőrzetű és nagyságú tacskók között engedélyezett.

A tigre színű tacskó tigre színű tacskóval történő pároztatása tiltott.

1.6 Elfogadott tacskó színek

A Standard ország fajtagondozó klubja a Deutsche Teckel Club (DTK) által elfogadott és a Tacskó Világszervezet (WUT) 2008. 02. 09- én Bécsben tartott ülésén megerősített és elfogadott tacskó színeket és szín elnevezéseket a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Felhívjuk a tenyésztők, tulajdonosok figyelmét, hogy az alombejelentőkön, nevezéseken stb. CSAK ezeket az elfogadott hivatalos tacsó szín megnevezéseket használják. Kérdéses esetben fordulhatnak a MTOE Tenyésztési Tanácsadóhoz.

1.7 Tenyészhely ellenőrzés , alomellenőrzés

Amennyiben bármilyen bejelentés érkezik az MTOE felé, vagy gyanú merül fel arra nézve, hogy a tenyésztő nem tartja be az MTOE tenyésztési szabályait és/vagy a hatályos törvények értelmében bármilyen módon csorbul az állatok jóléthez való joga, akkor az állatvédelmi normák betartására tenyészhely ellenőrzést kezdeményez az MTOE Tenyésztési Tanácsánál. A Tenyésztési Tanács helyszíni szemlét, alomellenőrzést rendelhet el. Alomellenőrzést kell elrendelni az egy almon belül született különböző szőrváltozatok esetén is.

1.8 MTOE Tenyésztési Felelős

A fajta tenyésztése során számos tenyésztési problémába ütközhet a tenyésztő. Az MTOE, mint hazai fajtagondozó szervezet alapvető célja, hogy a tacsó fajta tenyésztése minél magasabb szakmai szinten történjen. Ennek érdekében megbízásra kerül egy, a fajtát magas szinten ismerő szakmai vezető (Tenyésztési Felelős), akihez a tenyésztéssel kapcsolatos problémákkal, a fajtaspecifikus kérdésekkel lehet fordulni.

2. A tacsók helyes tartására, gondozására javaslat

A kutyatulajdonosnak nem szabad korlátoznia a tacsó fajtájának megfelelő mozgásigényét. Aki egy tacsót tart, gondoskodik vagy gondoskodnia kell róla, a fajtának megfelelő táplálást és ápolást, valamint egy viselkedésnek megfelelő, sajátosságát és a természetét szem előtt tartó elhelyezést kell nyújtania. A megkötve tartás minden tartási- és elhelyezési formában nem tekinthető a faj igényeinek megfelelőnek.

2.1 Kennelben tartás

A kutyákat csak akkor lehet nyitott vagy részben nyitott kennelben tartani, ha a kennelen belül vagy közvetlenül a kennellel összeköttetésben rendelkezésre áll egy védett helyiség (kutyaház).

Az ólnak minden oldalról hőszigetelő, egészségre ártalmatlan anyagból kell készülnie. Az anyagnak kidolgozottnak kell lennie, hogy a kutya ne sérülhessen meg miatta.

A védett helyiségnek az időjárás káros viszontagságai ellen védelmet kell nyújtania. Különösen kerülni kell, hogy a nedvesség behatoljon. A védett helyiséget úgy kell kimérni, hogy a kutya abban a viselkedésének megfelelően mozogni tudjon, és a helyiséget a testhőmérsékletével melegen tudja tartani. Belsejét tisztán, szárazon és élősködőtől mentesen kell tartani.

A helyiség ajtajának a kutya méretének megfelelőnek kell lennie; olyan nagynak szabad csak lennie, hogy a kutya akadálytalanul át tudjon jutni rajta. Az ajtót a szeles oldal felől el kell fordítani és a szél és csapadék ellen védeni kell. A tartózkodási helyet a védett helyiség szűkebb környezetében tisztán kell tartani. A padló olyan kiképzésű vagy kidolgozottságú kell legyen, hogy a nedvesség felszívódjon vagy el tudjon folyni.

Erős napsugárzás vagy magas külső hőmérséklet esetén a védett helyiségen kívüli árnyékos helyet kell a kutyának biztosítani. A kennel területét a benne tartott kutyák számának és

fajtájának megfelelően kell megválasztani. Ennek összhangban kell lennie a hatályos Kormány rendeleti szabályozással. Egy tacsó számára, a védett helység nélküli alapterületnek minimum 6 m² szükséges, minden további ugyanazon kennelben tartott kutyanak, kivétel a kölyökkutyák az anyával, további 3m²-t szükséges hozzáadni.

Az ehhez szükséges mértékeket a helyi adottságoknak megfelelően kell igazítani; minden esetben a legkevesebb szükséges szélesség és hosszúság figyelembevételével. Padlóját, kerítését és az egyéb berendezéseit az egészségre ártalmatlan anyagból kell előállítani, és úgy kell kidolgozni, hogy a kutya ne sérthesse meg magát. A kerítést úgy kell kiképezni, hogy a kutyák ne juthassanak rajta át. A kennel legalább egyik oldalának kilátást kell biztosítani. Ha a kennel padlózata nem hőszigetelő anyagból áll, akkor a védett helyiségen kívül egy hőszigetelt fekvőhelynek kell lennie. A padló olyan kiképzésű vagy kidolgozottságú kell legyen, hogy a nedvesség felszívódjon, vagy el tudjon folyni. A kennel belsejét tisztán, szárazon és élősködőktől mentesen kell tartani. A kutyákat a kennelen belül nem szabad megkötve tartani. Amennyiben a kutyákat egy kennelen belül különálló boxokban tartják, akkor a boxok elválasztását úgy kell kialakítani, hogy a kutyák ne juthassanak át és ne haraphassák ki. A boxok méreteire az előzőekben felsorolt követelmények az irányadóak. Ez értelemszerűen a szilárd építésű kennelekre is vonatkozik. Ebből kifolyólag ezeknek a kenneleknek elegendő napfényrel megvilágítottnak kell lennie. A bejutó napfény által megvilágított területnek a padló területének egy nyolcadát kell hogy kitegye. A kennelnek elegendő szellőzést kell biztosítani.

2.2 Egyéb tartás

Amennyiben a kutyákat szabad kifutón vagy pajtában, csűrben, használaton kívüli istállóban, tárolási épületben vagy egyéb hasonló helyiségben tartják, akkor egy védett területet kell számára rendelkezésre bocsátani, ami a korábbiakban felsorolt kritériumoknak megfelel.

2.3 Gondozás és ápolás

A tulajdonosnak vagy a gondozással és ápolással megbízott személynek naponta legalább egyszer meg kell győződnie a kutya egészségéről és az elhelyezésének állapotáról. A hiányosságokat haladéktalanul meg kell szüntetnie. Az etető és itató edényeket tisztán kell tartani. Egészségre ártalmatlan anyagból kell készülniük, és olyan kiképzésűnek kell lenniük, hogy a kutya ne sértse meg magát. Friss vizet mindenkor elegendő mennyiségben kell rendelkezésre bocsátani.

Amennyiben a kutyákat szabad kifutón vagy pajtában, csűrben, használaton kívüli istállóban, tárolási épületben vagy egyéb hasonló helyiségben tartják, akkor naponta legalább 60 percig ki kell engedni őket a szabadba.

2.4 Oltás és féregtelenítés

A fertőző betegségek elleni immunizáló védőoltás(ok) (parvo, kombinált stb.) beadása az állatorvos javaslatai szerint történjen. A kölyköket az alapvető immunizálás előtt 3 alkalommal féregteleníteni kell 2, 4, 6 hetes korban.

A kutyanak első évben 2 alkalommal kell veszettség oltást kapnia. Az elsőt 6 hónapos koráig a másodikat 12 hónapos koráig. Az ezt követő években ismétlődő veszettség és kombinált oltásokat kell beadatnunk a kutyáknak.

Ezek bizonyításához a tenyésztő köteles az alom minden tagja számára egy állatorvos által kitöltött nemzetközi oltási igazolványt rendszeresíteni.

Jelen szabályzat 2025.02.01-én lép életbe. A Tenyésztési Szabályzat csak az ezt követően tenyésztésbe állítandó egyedekre vonatkozik. A korábban megszerzett tenyész eredmények érvényben maradnak.

Kelt: Miskolc, 2024.11.29.

Alulírott Simon Virag, mint a Magyar Tacskósok Országos Egyesület elnöke igazolom, hogy a fenti irat az egyesületünk mai napon hatályos tenyésztési szabályzata.

Mellékletek
Tacskó színek

	Szín megnevezése magyar nyelven	Szín megnevezése német nyelven	Szín megnevezése angol nyelven
Rövidszőrű tacskó			
Egyszínű:	Vörös	Rot	Red
Kétszínűek: (fekete vagy barna alapon, rozsdabarna, vörös vagy sárga tűzésekkel)	Fekete-vörös	Schwarzrot	Black and tan
	Barna-vörös	Braunrot	Brown and tan
Tígerék: (alapszínük: fekete, vörös vagy barna, foltok: szürke vagy bézs)	Fekete tíger	Schwarztiger	Black tiger
	Vörös tíger	Rottiger	Red tiger
	Barna tíger	Brauntiger	Brown tiger
Csíkos:	Vörös csíkos	Rot Gestromt	Red Brindle
Hosszúszőrű tacskó			
Egyszínű:	Vörös	Rot	Red
Kétszínűek: (fekete vagy barna alapon, rozsdabarna, vörös vagy sárga tűzésekkel)	Fekete-vörös	Schwarzrot	Black and tan
	Barna-vörös	Braunrot	Brown and tan
Tígerék: (alapszínük: fekete, vörös vagy barna, foltok: szürke vagy bézs)	Fekete tíger	Schwarztiger	Black tiger
	Vörös tíger	Rottiger	Red tiger
	Barna Tíger	Brauntiger	Brown tiger

Szálkásszőrű tacskozó			
Egyszínű:	Vörös	Rot	Red
Kétszínűek: (fekete vagy barna alapon, rozsdabarna, vörös vagy sárga tűzésekkel)	Fekete-vörös	Schwarzrot	Black and tan
	Barna-vörös	Braunrot	Brown and tan
Vaddisznó színűek: (a szőrzet töve vöröses a végei sötétek)	Vaddisznó	Saufarben	Wild Boar
	Sötét-vaddisznó	Dunkelsaufarben	Darkness wild boar
	Világos-vaddisznó	Hellsaufarben	Pale wild boar
Tígerék: (vaddisznó, fekete, vörös vagy barna alapon, szürke vagy bézs foltok)	Vaddisznó-tíger	Saufarben tiger	Wild boar tíger
	Fekete-tíger	Schwarztiger	Black tiger
	Vörös-tíger	Rottiger	Red tiger
	Barna-tíger	Brauntiger	Brown tiger

A következő színű tacsók, illetve elnevezések NEM elfogadottak:

- barna tűzésekkel
- barna-fekete
- csoki
- csokoládé színű tűzésekkel
- fehér
- fehér-tíger
- fekete
- foltos
- harlequin
- kék-tíger
- mahagóni
- sárga
- sötét vadszínű
- szürke-tíger
- tigriscsíkos
- vadszínű
- vörösbarna
- barna foltos

Egyéb

Gyakoribb tacszó betegségek, melyek genetikailag szűrhetőek: jelenleg egyik sem kötelező csak javasolt.

- Chondrodystrophia (CDDY) és csigolyaközi lemezbetegség (IVDD)
- Progresszív retinol atrófia (leggyakoribb a miniatúr hosszú szőrű tacszóban)
- Osteogenesis Imperfecta (minden tacszóban fajtában)

- Narkolepszia (minden tacszó fajtában)
- Coat Colour Dilution*
- Neurológiai rendellenességek (főleg a törpetacszóban fedezték fel)
- Lafora-kór
- Végtag-öv izomdisztrófia (főleg a törpetacskónál fedezték fel)
- Neuronális ceroid lipofuscinosis